

(benralizumab) Fasenra®

معلومات مفيدة حول علاج الربو الشديد

مرحبًا بك في كتيب معلومات المريض!

ستجد في هذا الكتيب:

- معلومات للمريض حول دواء Fasenra (الصفحات 2 إلى 6)
- تعليمات إعطاء دواء Fasenra ذاتيًا (الصفحات 7 إلى 11)
- خطة علاج Fasenra الخاصة بك (الصفحات 12 إلى 18)

صُمم هذا الكتيب للمرضى في المملكة المتحدة الذين وُصف لهم دواء Fasenra لعلاج الربو اليوزيني الشديد. هذا الكتيب لا يحل محل نشرة معلومات المريض التي يجب عليك قراءتها إلى جانب هذا الكتيب والتي يمكن العثور عليها في كل عبوة لدواء Fasenra.

الدعم المستمر في رحلة العلاج

من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً | السبت من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً
خارج ساعات العمل، يُرجى الاتصال بطبيبك أو الممرضة أو الصيدلي، أو اتصل بالرقم 999 في حالة الطوارئ.

الخط الساخن للمريض:

08004 700329


Fasenra³⁶⁰

جرى تطوير هذا الكتيب وتمويله من قِبَل شركة AstraZeneca، الشركة المصنعة لدواء Fasenra.

ما هو الربو اليوزيني؟

اليوزينيات هي نوع من خلايا الدم البيضاء. وتعمل هذه الخلايا على حماية جسمك من بعض الالتهابات. وعادةً ما تعيش اليوزينيات لفترة قصيرة في جسمك، وبمجرد قيامها بمهمتها، يقوم جسمك بالتخلص منها. ولكن في الأشخاص المصابين بالربو اليوزيني، يكون هناك عدد كبير جدًا من اليوزينيات في الدم، والتي تنتقل إلى الرئتين، مسببة التهابًا يؤدي بدوره إلى مشاكل في التنفس. خلص طبيبك إلى أن أعراض الربو التي تعاني منها مرتبطة بمستويات عالية من اليوزينيات.


الخلايا الحمضية
في الرئتين



لماذا وصف لك طبيبك Fasenra؟

Fasenra هو علاج قابل للحقن يستخدم للربو اليوزيني الشديد والذي يستهدف اليوزينات بشكل مباشر، ما يساعد جسمك على التخلص منها من خلال الدم والرنيتين. قد يقلل هذا من عدد نوبات الربو التي تعاني منها، ويساعدك على التنفس بشكل أفضل، كما أنه يقلل من أعراض الربو. من المهم الاستمرار في تناول أي علاج آخر للربو (أجهزة استنشاق/أقراص) وصفه لك طبيبك.

إذا كنت تتناول
"الكورتيكوستيرويدات الفموية"،
فإن استخدام Fasenra قد يسمح
لك أيضًا بتقليل الجرعة اليومية
اللازمة للسيطرة على الربو أو
التوقف عن تناولها تمامًا.
ينبغي عليك اتباع نصيحة
طبيبك في هذا الشأن.




كيف ستتلقى حقن Fasenra الخاصة بك؟

سيقوم طبيب أو ممرضة أو اختصاصي رعاية صحية آخر بإعطائك الحقن تحت الجلد مباشرة في أعلى ذراعك، أو بطنك، أو فخذك.

ما لم يُخبرك طبيبك أو الممرضة بخلاف ذلك، سيكون جدول علاجك على النحو الموضح أدناه:

عامك الأول من العلاج باستخدام Fasenra



إذا لم تتمكن من حضور موعد تلقي حقنة Fasenra أو فاتتك جرعة: تواصل مع طبيبك أو ممرضتك في أقرب وقت ممكن لإعادة جدولة موعدك.
إيقاف العلاج بدواء Fasenra: لا تتوقف عن العلاج بدواء Fasenra إلا إذا نصحك طبيبك بذلك. قد يؤدي انقطاع أو إيقاف العلاج بدواء Fasenra إلى عودة أعراض الربو ونوباته.

هل هناك أي آثار جانبية لعلاج Fasenra؟

كما هو الحال مع جميع الأدوية، من الممكن أن تعاني من بعض الآثار الجانبية مع علاج Fasenra ولكن ليس كل الأشخاص يعانون من هذه الآثار.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة، والتي قد تؤثر على ما يصل إلى مريض واحد من كل 10 مرضى مصابين بالربو، ما يلي:

- الصداع
- التهاب البلعوم (التهاب الحلق)
- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)
- رد فعل في موضع الحقن (على سبيل المثال ألم، احمرار، حكة، تورم بالقرب من موضع الحقن)

قد يُصاب بعض الأشخاص بردود فعل تحسسية.

ردود الفعل هذه شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص)

تشمل الأعراض عادةً ما يلي:

- الشرى
- الطفح الجلدي

في بعض الحالات، قد يعاني المرضى

من رد فعل تحسسي شديدة

يُعرف باسم التأق.

ولكن لا يمكن تحديد معدل تكرارها

حسب البيانات المتوفرة. تشمل الأعراض عادةً ما يلي:

- تورم في الوجه أو اللسان أو الفم
- مشاكل في التنفس

• الإغماء، الدوار، الشعور بالدوار (بسبب انخفاض ضغط الدم)

اطلب العناية الطبية على الفور إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من رد فعل تحسسي.

قد تحدث مثل هذه التفاعلات خلال ساعات أو أيام بعد الحقن.

يُرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض الموجودة في عبوة Fasenra للحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية المحتملة.

إذا شعرت بأي آثار
جانبية، فتحدث إلى
طبيبك، أو الصيدلي،
أو الممرضة


إخبار طبيبك بكيفية سير علاجك

سيرغب طبيبك أو الممرضة في معرفة ما إذا كانت أعراض الربو تتحسن أو ما إذا كانت لا تزال تؤثر على حياتك اليومية.

قبل موعدك، خصص بضع دقائق للتفكير في النقاط التالية حتى تتمكن من منحهم صورة عامة جيدة عن مدى تقدمك.

النوم

هل يمنحك الربو من الحصول على نوم مريح خلال الليل؟



التنفس

هل تعاني من السعال أو الصفير؟



الأنشطة اليومية

هل أصبحت الآن أكثر قدرة على القيام بأنشطة معينة (مثل التسوق، والذهاب في نزهة على الأقدام) مقارنة بما كنت عليه قبل بدء العلاج؟ هل تواجه أي صعوبة في بعض الأنشطة؟



نوبات الربو

كم عدد الحالات (إن وُجدت) التي تعرضت لها؟ ما مدى شدتها؟



الدواء

هل تتناول جهاز الاستنشاق الوقائي حسب التعليمات؟ كم مرة تستخدم جهاز الاستنشاق المخفف للأعراض خاصتك؟ كم عدد أقراص الكورتيكوستيرويد التي تتناولها؟



أين تجد المزيد من المعلومات

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف، يجب عليك التحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي. يجب عليك أيضًا قراءة نشرة معلومات المريض لأنها تحتوي على معلومات مفيدة. يمكنك العثور على نشرة معلومات المريض في كل عبوة من Fasenra.

الإعطاء الذاتي لدواء

FASENRA® (benralizumab)

قلم معبأ مسبقاً

قبل استخدام قلم Fasenra، يجب على مقدم الرعاية الصحية أن يوضح لك أو لمقدم الرعاية المتابع لك كيفية استخدامه بشكل صحيح.

اقرأ "تعليمات الاستخدام" هذه قبل البدء في استخدام قلم Fasenra وفي كل مرة تعيد صرفه. قد تتوفر معلومات جديدة. لا تحل هذه المعلومات محل التحديث مع مقدم الرعاية الصحية المتابع لك بخصوص حالتك الطبية أو علاجك. إذا كان لديك أو لدى مقدم الرعاية أي أسئلة، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

معلومات مهمة

فم بتخزين Fasenra في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية في علبته الكرتونية حتى تصبح جاهزاً لاستخدامه. يمكن حفظ Fasenra في درجة حرارة الغرفة حتى 25 درجة مئوية لمدة أقصاها 14 يوماً. بعد إخراجها من الثلاجة، يجب استخدام Fasenra خلال 14 يوماً أو التخلص منه

لا تستخدم قلم Fasenra الخاص بك إذا:

لا تقم بما يلي:

- رج قلم Fasenra
- مشاركة قلم Fasenra أو إعادة استخدامه


- تم تجميده
- تم إسقاطه أو إتلافه
- تم كسر ختم الأمان الموجود على العلبة الكرتونية
- انقضى تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP)

إذا حدث أي مما سبق، فتخلص من قلم Fasenra في حاوية مقاومة للثقوب مخصصة للأدوات الحادة واستخدم قلم Fasenra جديدًا.

يحتوي كل قلم Fasenra على جرعة واحدة من Fasenra مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط. احفظ Fasenra وجميع الأدوية بعيدًا عن مرأى الأطفال ومتناول أيديهم.

تعليمات استخدام قلم Fasenra

لا تقم بإزالة الغطاء حتى تصل إلى الخطوة 6 من هذه التعليمات وتكون جاهزاً لحقن Fasenra.



الخطوة 1 - جمع الإمدادات

- 1 قلم Fasenna من التلاجة
 - 1 مسحة كحول
 - 1 كرة قطنية أو شاش
 - 1 حاوية للأدوات الحادة مقاومة للثقب.
- (انظر الخطوة 10 - التخلص من قلم Fasenna المستعمل بشكل آمن)

			
حاوية الأدوات الحادة	كرة قطنية أو شاش	مسحة كحول	قلم Fasenna

الخطوة 2 - الاستعداد لاستخدام قلم Fasenna



تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP). لا تستخدم المنتج إذا كان تاريخ انتهاء الصلاحية قد انقضى.

قبل الإعطاء، اترك القلم المعبأ مسبقاً حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة من 20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية عن طريق ترك العلبة الكرتونية خارج التلاجة لمدة 30 دقيقة تقريباً.

لا تقم بتدفئة قلم Fasenna بأي طريقة أخرى. على سبيل المثال، لا تقم بتدفئته في الميكروويف أو الماء الساخن، أو وضعه بالقرب من مصادر الحرارة الأخرى.

استخدم Fasenna خلال 14 يوماً من إخراجها من التلاجة.


لا تقم بإزالة الغطاء حتى تصل إلى الخطوة 6.

الخطوة 3 - التحقق من السائل

فُحِّمِ بالبقاء نظرة على السائل الموجود في قلم Fasenna من خلال نافذة العرض. يجب أن يكون السائل شفافاً وعديم اللون إلى الأصفر. قد يحتوي على جزيئات بيضاء صغيرة.

تجنب حقن Fasenna إذا كان السائل عكراً أو متغير اللون أو يحتوي على جزيئات كبيرة.

قد تلاحظ وجود فقاعة هواء صغيرة في السائل. هذا أمر طبيعي، ولا داعي لفعل أي شيء حيالها.




الخطوة 4 - اختيار موضع الحقن

الموقع الموصى به للحقن هو الجزء الأمامي من فخذك. يمكنك أيضاً استخدام الجزء السفلي من بطنك.


لا تحقن:

- في المنطقة المحيطة بالسرة بمسافة 5 سم
 - في المناطق التي يكون فيها الجلد رقيقاً أو متكدماً أو متقشرًا أو صلبًا
 - في الندبات أو الجلد المتضرر
 - من خلال الملابس
- قد يقوم مقدم رعاية بحقنك في الجزء العلوي من الذراع، أو الفخذ، أو البطن. لا تحاول حقن نفسك في الذراع.
- بالنسبة لكل حقنة، اختر مكانًا مختلفًا يبعد 3 سم على الأقل عن المكان الذي تم حقنك فيه آخر مرة.




الخطوة 5 - تنظيف موضع الحقن

- اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون.
- قُم بتنظيف موضع الحقن باستخدام مسحة كحولية بحركة دائرية. دعها تجف في الهواء.
- لا تلمس المنطقة المنظفة قبل الحقن.
- لا تقم بالتهوية أو النفخ على المنطقة التي تم تنظيفها.



الخطوة 6 - اسحب الغطاء

- امسك قلم Fasenra بيد واحدة. اسحب الغطاء بحذر وبشكل مستقيم باستخدام يدك الأخرى.
- ضع الغطاء جانبًا للتخلص منه لاحقًا.
- سيظهر الآن واقي الإبرة الأخضر، ووظيفته هي حمايتك من لمس الإبرة.
- لا تحاول لمس الإبرة أو الضغط على واقي الإبرة بإصبعك.
- لا تحاول إعادة الغطاء إلى قلم Fasenra. فقد تتسبب في حدوث الحقن مبكرًا جدًا أو إتلاف الإبرة.
- قُم بإكمال الخطوات التالية فورًا بعد إزالة الغطاء.




الخطوة 7 - حقن Fasenna

اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية حول كيفية الحقن. يمكنك الضغط بلطف على موضع الحقن أو إعطاء الحقنة دون الضغط على الجلد.

قُم بحقن Fasenna باتباع الخطوات الموضحة في الأشكال أ، ب، ج، ود.

أمسك قلم Fasenna في مكانه طوال فترة الحقن.


لا تغيّر موضع قلم Fasenna بعد بدء الحقن.



ب

اضغط لأسفل بقوة.


سوف تسمع صوت طقطقة. تخبرك صوت "الطقطقة" أن الحقنة قد بدأت. سوف يتحرك المكبس الأخضر إلى الأسفل في نافذة العرض أثناء الحقن.



أ

قُم بوضع قلم Fasenna في موضع الحقن.


ضع واقي الإبرة الخاص بقلم Fasenna بشكل مسطح على جلدك (بزواية 90 درجة). تأكد من أنك تستطيع رؤية نافذة العرض



د

ارفع قلم Fasenna إلى أعلى بشكل مستقيم.

سوف ينزلق واقي الإبرة لأسفل ويثبت في مكانه فوق الإبرة.



ج


استمر في الضغط بقوة لمدة 15 ثانية.

سوف تسمع صوت "طقطقة" ثانية. الطقطقة الثانية تخبرك بأن الحقنة قد انتهت. سوف يملأ المكبس الأخضر نافذة العرض.

الخطوة 8 - التحقق من نافذة العرض

افحص نافذة العرض للتأكد من حقن كل السائل.

إذا لم يملأ المكبس الأخضر نافذة العرض، فقد لا تكون قد تلقيت الجرعة كاملة. إذا حدث هذا أو إذا كانت لديك أي مخاوف أخرى، اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.




الخطوة 9 - التحقق من موضع الحقن

قد يكون هناك كمية صغيرة من الدم أو السائل في موضع الحقن. هذا أمر طبيعي.

اضغط بلطف على جلدك باستخدام كرة قطنية أو شاش حتى يتوقف النزيف.

لا تحك موضع الحقن.

إذا لزم الأمر، قم بتغطية موضع الحقن بضمادة صغيرة.



الخطوة 10 - التخلص من قلم Fasenra المستعمل بشكل آمن

• يحتوي كل قلم Fasenra على جرعة واحدة من Fasenra ولا يمكن إعادة استخدامه.

• ضع قلم Fasenra المستعمل في حاوية للأدوات الحادة مقاومة للثقب مباشرة بعد الاستخدام.

لا تتخلص من قلم Fasenra في النفايات المنزلية.

فم بالتخلص من الغطاء والمستلزمات الأخرى المستخدمة في نفايات منزلك.



إرشادات التخلص من النفايات

تخلص من العبوة بالكامل حسب إرشادات مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي. لا تقم بإعادة تدوير حاوية الأدوات الحادة المستخدمة.

خطة علاج الربو الشديد باستخدام Fasenra® (benralizumab)

استخدم هذا القسم لتتبع جدول علاجك، والتغيرات في الأعراض، وتقدمك العام خلال فترة العلاج باستخدام Fasenra.

الاسم:

اسم الطبيب/الممرضة:

تتبع مدى فعالية Fasenra بالنسبة لك

يرجى ملء هذا
القسم بمساعدة
طبيبك/ممرضتك

للمساعدة في تخفيف أعراض الربو لديك، وصف لك
طبيبك دواء Fasenra.

يُعطى هذا العلاج لك عن طريق الحقن، لذلك قد يكون مختلفًا عن أدوية الربو الأخرى التي استخدمتها في الماضي.
صُمم هذا القسم لمساعدتك طوال فترة العلاج.

ما لم يُخبرك طبيبك بخلاف ذلك، ستحصل على العلاج كل أربعة أسابيع لأول ثلاث حقن، ثم مرة واحدة كل ثمانية
أسابيع. من المهم الاستمرار في تناول أي علاج آخر للربو (أجهزة الاستنشاق/الأقراص) وصفه لك طبيبك.

قبل كل موعد، يُرجى إكمال "متعقب الأعراض" في الصفحتين 15 و16. أحضر هذا الكتيب معك إلى كل موعد
لمساعدة طبيبك أو ممرضتك على فهم مدى تقدم حالتك على العلاج الذي تتلقاه.

عندما تبدأ العلاج باستخدام Fasenra، قد يكون من المفيد أيضًا تدوين أهدافك قصيرة المدى وطويلة المدى في
الصفحة 17، ثم معرفة عدد الأهداف التي يمكنك تحقيقها.

خطة علاج الربو الخاصة بك

أول 3 حقن كل 4 أسابيع، ثم كل 8 أسابيع بعد ذلك

Fasenra

أدويةك اليومية

قُم بإدراج كل أدوية الربو اليومية التي تتناولها في الصفوف أدناه:

الدواء

الجرعة اليومية مثل عدد الاستنشاقات أو الأقراص

جهاز الاستنشاق الأزرق الخاص بك (إذا كان لديك واحد)

قد تتلقى جرعة أكبر أو أقل من جهاز الاستنشاق الأزرق الخاص بك اعتمادًا على أعراض الربو لديك، لذا يُرجى تدوين جرعتك الأخيرة:

الدواء

الجرعة مثل
عدد الاستنشاقات

كم من الوقت استغرق
تحسن الأعراض؟

إذا كنت تعاني من نوبة ربو، فاطلب المشورة الطبية على الفور، واتصل بالرقم 999 واتبع خطة عمل الربو الشخصية

تتبع التحسينات

من الجيد أن تسجل التغييرات التي تطرأ على أعراض الربو لديك لمساعدة طبيبك أو الممرضة على متابعة تقدم حالتك على العلاج.

إكمال الورقة أدناه سيعطيك سجلًا دقيقًا لشعورك قبل بدء العلاج بدواء Fasenra. من خلال مقارنة هذه المعلومات بالإدخالات أثناء علاجك بدواء Fasenra، ستتمكن من معرفة ما إذا كانت الأعراض لديك تتحسن وما إذا كنت قادرًا على أداء الأنشطة اليومية التي وجدتتها صعبة للغاية في السابق.

نظرة عامة على مرض الربو لديك قبل البدء في تناول Fasenra

كيف تُقيّم أعراض الربو لديك؟

من 1 إلى 5 حيث 1 "جيد" و 5 "سيء"

كم مرة تؤثر الأعراض لديك على نومك؟

من 1 إلى 5 حيث 1 "نادرًا"، و 5 "كل ليلة"

كم مرة في الأسبوع تحتاج إلى استخدام

جهاز الاستنشاق المخفف للأعراض الخاص بك؟

كم عدد نوبات الربو التي أصبت بها خلال الأشهر الستة الماضية؟

كم عدد جرعات أقراص الستيرويد الفموية التي تناولتها

في الأشهر الستة الماضية؟

في الأشهر الستة الماضية، كم مرة كان عليك الذهاب إلى المستشفى بسبب تفاقم حالة الربو

لديك؟

هل لديك أي آثار جانبية للعلاج؟

نعم أو لا

إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي؟

هل هناك أي أنشطة يومية لا تستطيع القيام بها؟

إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي؟

مع تقدم علاجك، راجع هذه الصفحة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تغيير.

نظرة عامة على الربو لديك أثناء العلاج

بدواء Fasenra

رقم الحقنة	2 التاريخ:	3 التاريخ:	4 التاريخ:
منذ آخر حقنة لك من Fasenra:			
			كيف تُقيم أعراض الربو لديك؟ من 1 إلى 5 حيث 1 "جيد" و 5 "سيء"
			كم مرة تؤثر الأعراض لديك على نومك؟ من 1 إلى 5 حيث 1 "نادراً"، و 5 "كل ليلة"
			كم مرة في الأسبوع تحتاج إلى استخدام جهاز الاستنشاق المخفف للأعراض الخاص بك؟
			كم عدد نوبات الربو التي أصبت بها؟
			كم عدد جرعات أقراص الستيرويد القموية التي تناولتها؟
			كم مرة كان عليك الذهاب إلى المستشفى بسبب تفاقم حالة الربو لديك؟
			هل لديك أي آثار جانبية للعلاج؟ نعم أو لا
			إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي؟
			هل هناك أي أنشطة يومية لا يمكنك القيام بها/يمكنك القيام بها الآن؟ نعم أو لا
			إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي؟

نظرة عامة على الربو لديك أثناء العلاج

بدواء Fasenra

رقم الحقنة

5 التاريخ: 6 التاريخ: 7 التاريخ: 8 التاريخ:

منذ آخر حقنة لك من Fasenra:

كيف تُقيّم أعراض الربو لديك؟
من 1 إلى 5 حيث 1 "جيد" و 5 "سيء"

--	--	--	--

كم مرة تؤثر الأعراض لديك على نومك؟
من 1 إلى 5 حيث 1 "نادرًا"، و 5 "كل ليلة"

--	--	--	--

كم مرة في الأسبوع تحتاج إلى استخدام جهاز الاستنشاق
المخفف للأعراض الخاص بك؟

--	--	--	--

كم عدد نوبات الربو التي أصبت بها؟

--	--	--	--

كم عدد جرعات أقراص الستيرويد الفموية التي تناولتها؟

--	--	--	--

كم مرة كان عليك الذهاب إلى المستشفى بسبب تفاقم حالة
الربو لديك؟

--	--	--	--

هل لديك أي آثار جانبية للعلاج؟
نعم أو لا

--	--	--	--

إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي؟

--	--	--	--

هل هناك أي أنشطة يومية لا يمكنك القيام بها/يمكنك القيام
بها الآن؟

--	--	--	--

نعم أو لا

إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي؟

--	--	--	--

أهدافي

ما الذي تود أن تفعله ويمنعك الربو من القيام به؟

الغرض من هذا القسم هو تسجيل أهدافك قصيرة المدى بعد بدء العلاج بدواء Fasenra. فكّر في أحد الأنشطة اليومية التي تجد صعوبة في القيام بها بسبب مرض الربو، على سبيل المثال المشي إلى المتاجر بمفردك.

أهدافي قصيرة المدى

(أمثلة: المشي إلى المتاجر، القيام ببعض الأعمال في المنزل، الطهي أثناء الوقوف)

يُرجى إكمال هذه
الصفحة بمساعدة
طبيبك/ممرضتك

عندما تفكر فيما حققته خلال الأشهر القليلة الماضية، ما الذي ترغب في تحقيقه خلال الأشهر القليلة القادمة؟

في هذا القسم، يمكنك تسجيل أي أنشطة رئيسية كنت تجد صعوبة في القيام بها سابقاً، أو تجنبتها بسبب الربو.

أهدافي طويلة المدى

(أمثلة: الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع خارج المنزل، أو الذهاب في جولة قصيرة بالدراجة في المنتزه، أو اللعب مع أطفال/أحفادي)

في كل مرة يكون لديك موعد مع طبيبك/ممرضتك، ألق نظرة لترى ما حققته وضع علامة عليه لئلا تُنسى لهم التقدم الذي تحرزه.

معلومات عن الآثار الجانبية المحتملة

إذا شعرت بأي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك، أو الصيدلي، أو الممرضة

كما هو الحال مع جميع الأدوية، من الممكن أن تعاني من بعض الآثار الجانبية مع علاج Fasenna ولكن ليس كل الأشخاص يعانون من هذه الآثار.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة، والتي قد تؤثر على ما يصل إلى مريض واحد من كل 10 مرضى مصابين بالربو، ما يلي:

- الصداع
- التهاب البلعوم (التهاب الحلق)
- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)
- رد فعل في موضع الحقن (على سبيل المثال ألم، احمرار، حكة، تورم بالقرب من موضع الحقن)

قد يُصاب بعض الأشخاص بردود فعل تحسسية.

ردود الفعل هذه شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص) تشمل الأعراض عادةً ما يلي:

• الشرى

• الطفح الجلدي

في بعض الحالات، قد يعاني المرضى من رد فعل تحسسي شديد يُعرف باسم التأق. ولكن لا يمكن تحديد معدل تكرارها من خلال البيانات المتاحة.

تشمل الأعراض عادةً ما يلي:

• تورم في الوجه أو اللسان أو الفم

• مشاكل في التنفس

• الإغماء، الدوار، الشعور بالدوار (بسبب انخفاض ضغط الدم)

اطلب العناية الطبية على الفور إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من رد فعل تحسسي.

قد تحدث مثل هذه التفاعلات خلال ساعات أو أيام بعد الحقن.

يُرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض الموجودة في عبوة Fasenna للحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية المحتملة.

أين تذهب للحصول على الدعم والمشورة

املاً هذا بمساعدة طبيبك أو الممرضة:

اسم الطبيب/الممرضة:

تفاصيل الاتصال:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا شعرت بأي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك، أو الصيدلي، أو الممرضة. يشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في نشرة العبوة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر نظام Yellow Card على: www.mhra.gov.uk/yellowcard وبالإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات عن سلامة هذا الدواء

الدعم المستمر في رحلة العلاج

من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً |
السبت من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً
خارج ساعات العمل، يرجى الاتصال بطبيبك أو الممرضة أو الصيدلي،
أو اتصل بالرقم 999 في حالة الطوارئ.

الخط الساخن للمريض:

08004 700329

Fasenra[®]360

تم إنتاجه وتمويله بواسطة:

AstraZeneca

