

Fasenra® (benralizumab)

Przydatne informacje na temat leczenia ciężkiej astmy

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dla pacjenta!

Niniejsza broszura zawiera:

- **Informacje dla pacjentów dotyczące leku Fasenra** (strony 2–6)
- **Instrukcja samodzielnego podawania leku Fasenra** (strony 7–11)
- **Twój plan leczenia z zastosowaniem leku Fasenra** (strony 12–18)

Niniejsza broszura jest przeznaczona dla pacjentów w Wielkiej Brytanii, którym przepisano lek Fasenra w związku z ciężką astmą eozynofilową. Nie zastępuje ona ulotki dla pacjenta, którą należy przeczytać niezależnie od niniejszej broszury, a która znajduje się w każdym opakowaniu leku Fasenra.

Fasenra[®] 360°

Ciągłe wsparcie w trakcie leczenia

Infolinia dla pacjentów:
08004 700329

Pon.-pt. 8:00-18:00 | Sob. 9:00-17:00

Poza godzinami pracy prosimy o kontakt ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą, a w nagłych przypadkach należy zadzwonić pod numer 999.

Niniejsza broszura została opracowana i sfinansowana przez firmę AstraZeneca, producenta leku Fasenra.


Czym jest astma eozynofilowa?

Eozynofile to rodzaj białych krwinek. Komórki te chronią organizm przed niektórymi zakażeniami.

Zazwyczaj eozynofile żyją w organizmie krótko, a gdy spełnią swoją funkcję, organizm je usuwa.

Jednakże we krwi osób z astmą eozynofilową występuje zbyt wiele eozynofili, które dostają się do płuc, powodując stan zapalny, który z kolei prowadzi do problemów z oddychaniem.

Zdaniem Twojego lekarza występujące u Ciebie objawy astmy są związane z wysokim poziomem eozynofili.




Dlaczego lekarz przepisał Ci lek Fasenra?

Fasenra to wstrzykiwany lek stosowany w leczeniu ciężkiej astmy eozynofilowej, który bezpośrednio oddziałuje na eozynofile, pomagając organizmowi w ich eliminacji z krwi i płuc.

Może to zmniejszyć liczbę napadów astmy, ułatwić oddychanie i złagodzić objawy astmy.

Ważne jest, aby nadal przyjmować wszelkie inne leki na astmę (inhalatory/ tabletki) przepisane przez lekarza.




W przypadku przyjmowania doustnych kortykosteroidów stosowanie leku Fasenra może również umożliwić zmniejszenie dawki dobowej potrzebnej do kontrolowania astmy lub całkowite zaprzestanie ich przyjmowania. W tej kwestii należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W jaki sposób przyjmuje się wstrzyknięcia leku Fasenra?

Lekarz, pielęgniarka albo inny pracownik opieki zdrowotnej podaje wstrzyknięcia tuż pod skórę ramienia, brzucha albo uda.

Jeżeli lekarz lub pielęgniarka nie zaleci inaczej, harmonogram leczenia będzie wyglądać następująco:

Pierwszy rok leczenia z zastosowaniem leku Fasenra



Jeśli nie możesz przyjść na wizytę związaną z podaniem leku Fasenra albo w przypadku pominięcia dawki leku Fasenra należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim lekarzem albo pielęgniarką, aby ustalić nowy termin wizyty.

Zaprzestanie leczenia z zastosowaniem leku Fasenra: nie należy zaprzestawać leczenia z zastosowaniem leku Fasenra, o ile nie zaleci tego lekarz. Przerwanie albo zaprzestanie leczenia z zastosowaniem leku Fasenra może spowodować nawrót objawów i napadów astmy.

Czy leczenie z zastosowaniem leku Fasenra wiąże się z występowaniem jakichkolwiek działań niepożądanych?

Podobnie jak w przypadku każdego leku, w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Fasenra mogą wystąpić pewne działania niepożądane, jednak nie u wszystkich one wystąpią.

Częste działania niepożądane, które mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów z astmą, to:

- Ból głowy
- Zapalenie gardła (ból gardła)
- Gorączka (wysoka temperatura)
- Reakcja w miejscu wstrzyknięcia (np. ból, zaczerwienienie, świąd, obrzęk w pobliżu miejsca podania wstrzyknięcia)

U niektórych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Reakcje te są częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

Objawy są zazwyczaj następujące:

- Pokrzywka
- Wysypka

W niektórych przypadkach może wystąpić ciężka reakcja alergiczna określana jako anafilaksja.

Częstości występowania nie można jednak określić na podstawie dostępnych danych.

Objawy są zazwyczaj następujące:

- Obrzęk twarzy, języka albo ust
- Problemy z oddychaniem
- Omdlenia, zawroty głowy, uczucie oszołomienia (spowodowane spadkiem ciśnienia krwi)

W przypadku podejrzenia wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Reakcje takie mogą wystąpić w ciągu kilku godzin albo dni po wstrzyknięciu.

Więcej informacji na temat możliwych działań niepożądanych można znaleźć w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania leku Fasenra.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Informowanie lekarza o przebiegu leczenia


Lekarz lub pielęgniarka będzie chciał wiedzieć, czy występujące u Ciebie objawy astmy ulegają złagodzeniu, czy też nadal wpływają na Twoje codzienne życie.

Przed wizytą poświęć kilka minut na przemyślenie poniższych kwestii, aby móc przedstawić właściwy ogólny obraz swojego stanu.



Oddech

Czy występuje u Ciebie kaszel bądź świszczący oddech?



Sen

Czy astma uniemożliwia Ci spokojny sen w nocy?



Napady astmy

Ile (jeśli w ogóle) ich wystąpiło?
Jak nasilone były?



Codzienne czynności

Czy obecnie jesteś w stanie wykonywać określone czynności (np. robić zakupy, wychodzić na spacer) łatwiej niż przed rozpoczęciem leczenia?



Lek

Czy stosujesz inhalator z lekiem zapobiegawczym zgodnie z zaleceniami?

Jak często stosujesz inhalator z lekiem łagodzącym?

Ile tabletek kortykosteroidów przyjmujesz?

Czy masz trudności z wykonywaniem określonych czynności?

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Należy również zapoznać się z ulotką dla pacjenta, gdyż zawiera ona przydatne informacje. Ulotkę dla pacjenta można znaleźć w każdym opakowaniu leku Fasenra.

Samodzielne podawanie LEKU FASENRA[®]

(benralizumab)

Wstrzykiwacz

Przed użyciem wstrzykiwacza Fasenra Pen pracownik opieki zdrowotnej powinien pokazać Tobie albo Twojemu opiekunowi, jak prawidłowo go używać.

Przed rozpoczęciem korzystania ze wstrzykiwacza Fasenra Pen oraz za każdym razem po ponownym wypełnieniu należy przeczytać niniejszą Instrukcję używania. Mogą pojawić się nowe informacje. Zawarte tu informacje nie zastępują konsultacji ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej w zakresie choroby albo leczenia.

W przypadku ewentualnych pytań należy skonsultować się ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej.

Ważne informacje

Lek Fasenra należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C w opakowaniu kartonowym do momentu użycia. Lek Fasenra można przechowywać w temperaturze pokojowej do 25°C przez maksymalnie 14 dni. Po wyjęciu z lodówki lek Fasenra należy zużyć w ciągu 14 dni albo wyrzucić.

Nie wolno używać wstrzykiwacza Fasenra Pen, jeśli:

- został zamrożony,
- został upuszczony lub uszkodzony,
- zabezpieczenie na opakowaniu kartonowym zostało naruszone,
- upłynął jego termin ważności.

Nie wolno:

- potrząsać wstrzykiwaczem Fasenra Pen,
- udostępniać innym osobom ani ponownie korzystać ze wstrzykiwacza Fasenra Pen.


W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji należy wyrzucić wstrzykiwacz Fasenra Pen do odpornego na przebicie pojemnika na ostre odpady i użyć nowego wstrzykiwacza Fasenra Pen.

Każdy wstrzykiwacz Fasenra Pen zawiera 1 dawkę leku Fasenra przeznaczoną wyłącznie do jednorazowego użytku.

Lek Fasenra i wszystkie leki należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Instrukcja używania wstrzykiwacza Fasenra Pen

Nie wolno zdejmować nasadki aż do Kroku 6 niniejszej instrukcji i gotowości do wykonania wstrzyknięcia leku Fasenra.



Krok 1 – Przygotowanie materiałów

- 1 wstrzykiwacz Fasenra Pen z lodówki
 - 1 wacik nasączony alkoholem
 - 1 bawełniany wacik albo gazik
 - 1 odporny na przebicie pojemnik na ostre odpady.
- (Patrz Krok 10 – Bezpieczna utylizacja zużytego wstrzykiwacza Fasenra Pen)



Krok 2 – Przygotowanie się do użycia wstrzykiwacza Fasenra Pen

Należy sprawdzić datę ważności (EXP). Nie używać po upływie terminu ważności.

Przed podaniem należy wyjąć opakowanie kartonowe z lodówki i pozostawić wstrzykiwacz na około 30 minut, aby uzyskać temperaturę pokojową (20°C–25°C).

Nie wolno ogrzewać wstrzykiwacza Fasenra Pen w żaden inny sposób. Przykładowo, nie wolno podgrzewać go w kuchence mikrofalowej ani umieszczać w gorącej wodzie bądź w pobliżu innych źródeł ciepła.

Należy zużyć lek Fasenra w ciągu 14 dni od wyjęcia z lodówki.

Nie wolno zdejmować nasadki aż do Kroku 6.




Krok 3 – Sprawdzenie płynu

Należy przyrzeć się płynowi we wstrzykiwaczu Fasenra Pen przez okienko podglądu. Płyn powinien być klarowny, bezbarwny do żółtego. Może zawierać małe, białe cząstki.

Nie wolno wykonywać wstrzyknięcia leku Fasenra, jeżeli płyn jest mętny, odbarwiony albo zawiera duże cząstki.

W płynie może być widoczny mały pęcherzyk powietrza. Jest to normalne. Nie należy w związku z tym nic robić.



Krok 4 – Wybór miejsca wstrzyknięcia


Zalecany miejscem wstrzyknięcia jest przednia strona uda. Może to być również dolna część brzucha.

Nie podawać wstrzyknięcia:

- w obszar o promieniu 5 cm wokół pępka;
- w miejsca, gdzie skóra jest tkliwa, zasiniona, łuszcząca się albo twarda;
- w blizny albo uszkodzoną skórę;
- przez ubranie.

Opiekun może podać wstrzyknięcie w ramię, udo albo brzuch. **Nie wolno** próbować podać wstrzyknięcia samodzielnie w ramię.

W przypadku każdego wstrzyknięcia należy wybrać inne miejsce znajdujące się w odległości co najmniej 3 cm od miejsca poprzedniego wstrzyknięcia.




Krok 5 – Oczyszczanie miejsca wstrzyknięcia

Należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

Okrężnym ruchem oczyścić miejsce wstrzyknięcia wacikiem nasączonym alkoholem. Pozostawić do wyschnięcia.

Nie wolno dotykać oczyszczonego obszaru przed podaniem wstrzyknięcia.

Nie wolno wachlować oczyszczonego obszaru ani na niego dmuchać.



Krok 6 – Zdejmowanie nasadki

Trzymać wstrzykiwacz Fasenra Pen jedną ręką. Drugą ręką ostrożnie ściągnąć nasadkę jednym ruchem.


Odłożyć nasadkę na bok, aby później ją wyrzucić.

Zielona osłona igły jest teraz odsłonięta. Ma ona na celu zapobiegać dotykaniu igły.

Nie wolno próbować dotykać igły ani naciskać palcem na osłonę igły.

Nie wolno próbować zakładać nasadki z powrotem na wstrzykiwacz Fasenra Pen. Może to spowodować przedwczesne wstrzyknięcie albo uszkodzenie igły.

Natychmiast po zdjęciu nasadki należy wykonać czynności opisane w kolejnych krokach.




Krok 7 – Wstrzyknięcie leku Fasenra

Należy postępować zgodnie z zaleceniami świadczeniodawcy opieki zdrowotnej w zakresie sposobu podawania wstrzyknięcia. Można delikatnie ścisnąć skórę w miejscu wstrzyknięcia albo wykonać wstrzyknięcie bez ściskania skóry.

Wstrzyknąć lek Fasenra, wykonując czynności przedstawione na rysunkach **a**, **b**, **c** and **d**.


Należy trzymać wstrzykiwacz Fasenra Pen w miejscu przez cały czas podawania wstrzyknięcia.

Nie wolno zmieniać położenia wstrzykiwacza Fasenra Pen po rozpoczęciu podawania wstrzyknięcia.




Umieścić wstrzykiwacz Fasenra Pen w miejscu wstrzyknięcia.

Przyłożyć osłonę igły wstrzykiwacza Fasenra Pen prostopadle do skóry (pod kątem 90 stopni). Upewnić się, że okienko podglądu jest widoczne




Mocno nacisnąć.

Słyszalne będzie kliknięcie. „Kliknięcie” oznacza, że rozpoczęto podawanie wstrzyknięcia. W trakcie podawania wstrzyknięcia zielony tłok będzie przesuwać się w dół w okienku podglądu.



Przytrzymać mocno przez 15 sekund.

Słyszalne będzie drugie „kliknięcie”. Drugie kliknięcie oznacza, że zakończono podawanie wstrzyknięcia. Zielony tłok wypełni okienko podglądu.



Należy podnieść wstrzykiwacz Fasenra Pen pionowo w górę.


Osłona igły zsunie się wzdłuż igły i ją zablokuje.

Krok 8 – Sprawdzenie okienka podglądu


Należy sprawdzić w okienku podglądu, czy wstrzyknięto całość płynu.

Jeżeli zielony tłok nie wypełnia całego okienka podglądu, istnieje możliwość, że nie podano pełnej dawki. W takiej sytuacji albo w przypadku ewentualnych innych wątpliwości należy zadzwonić do świadczeniodawcy opieki zdrowotnej.

Przed
wstrzyknięciem



Po
wstrzyknięciu




Krok 9 – Sprawdzenie miejsca wstrzyknięcia

W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się niewielka ilość krwi albo płynu. Jest to normalne.

Należy delikatnie docisnąć do skóry bawełniany wacik albo gazik do momentu ustąpienia krwawienia.

Nie wolno pocierać miejsca wstrzyknięcia.

W razie konieczności owinać miejsce wstrzyknięcia małym bandażem.



Krok 10 – Bezpieczna utylizacja zużytego wstrzykiwacza Fasenra Pen

- Każdy wstrzykiwacz Fasenra Pen zawiera pojedynczą dawkę leku Fasenra i **nie wolno używać go ponownie**.
- Natychmiast po użyciu należy umieścić zużyty wstrzykiwacz Fasenra Pen w odpornym na przebicie **pojemniku na ostre odpady**.

Nie wolno wyrzucać wstrzykiwacza Fasenra Pen do odpadów domowych.

Nasadkę i pozostałe wykorzystane materiały należy wyrzucić do odpadów domowych.

Wytyczne dotyczące utylizacji

Pełny pojemnik należy zutylizować zgodnie z zaleceniami świadczeniodawcy opieki zdrowotnej lub farmaceuty.

Nie wolno ponownie wykorzystywać zużytego pojemnika na ostre odpady.



Twój plan leczenia ciężkiej astmy z zastosowaniem leku Fasenra® (benralizumab)

Ta część służy do dokumentowania harmonogramu leczenia, zmian w zakresie objawów oraz ogólnych postępów w trakcie trwania leczenia z zastosowaniem leku Fasenra.

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko lekarza/pielęgniarki:

Monitorowanie skuteczności leku Fasenra

Lekarz przepisał Ci lek Fasenra, aby złagodzić występujące u Ciebie objawy astmy.

Należy wypełnić
tę część z
pomocą lekarza/
pielęgniarki

Ten rodzaj leku podaje się w postaci wstrzyknięcia, co może różnić się od innych leków na astmę stosowanych w przeszłości. Ta część została opracowana w celu zapewnienia pomocy w całym procesie leczenia.

O ile nie poinformowano inaczej, lek będzie podawany co cztery tygodnie w przypadku pierwszych trzech wstrzyknięć, a następnie co osiem tygodni. Ważne jest, aby nadal przyjmować wszelkie inne leki na astmę (inhalatory/tabletki) przepisane przez lekarza.

*Przed każdą wizytą należy wypełnić część „**Monitorowanie objawów**” na stronach 15 i 16. Należy przynosić tę broszurę na każdą wizytę, aby pomóc lekarzowi albo pielęgniarce uzyskać informacje o przebiegu leczenia.*

Rozpoczynając leczenie z zastosowaniem leku Fasenra, warto też zapisać sobie na stronie 17 swoje krótkoterminowe i długoterminowe cele, a następnie ocenić, ile z nich uda się osiągnąć.

Twój plan leczenia astmy

Fasenra

Pierwsze 3 wstrzyknięcia co 4 tygodnie, a następnie co 8 tygodni

Przyjmowane codziennie leki

W poniższych wierszach należy wpisać wszystkie przyjmowane codziennie leki na astmę:

Lek	Dawka dzienna, np. liczba inhalacji albo tabletek

Niebieski inhalator (jeśli jest używany)

W zależności od objawów astmy możesz przyjmować większą lub mniejszą dawkę z niebieskiego inhalatora, dlatego zapisz ostatnio przyjętą dawkę:

Lek	Dawka, np. liczba inhalacji	Po jakim czasie nastąpiło złagodzenie objawów?

W przypadku napadu astmy należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, zadzwonić pod numer 999 i postępować zgodnie ze swoim osobistym planem leczenia astmy

Monitorowanie poprawy

Dobrym pomysłem jest zapisywanie zmian w objawach astmy, aby pomóc lekarzowi lub pielęgniarce monitorować postępy w leczeniu.

Wypełnienie poniższego arkusza pozwoli uzyskać dokładną dokumentację samopoczucia przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Fasenra. Porównanie tych informacji z wpisami dokonanymi w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Fasenra umożliwi ocenę, czy objawy ulegają złagodzeniu i czy jesteś w stanie wykonywać codzienne czynności, które wcześniej sprawiały Ci trudność.

Informacje na temat astmy przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Fasenra

Jak oceniasz występujące u Ciebie objawy astmy?

Od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Dobre”, a 5 oznacza „Złe”

Jak często objawy wpływają na Twój sen?

Od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Rzadko”, a 5 oznacza „Każdej nocy”

Ile razy w tygodniu musisz używać swojego inhalatora z lekiem łagodzącym objawy?

Ile napadów astmy wystąpiło u Ciebie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?

Ile cykli leczenia doustnymi sterydami w tabletkach zastosowano w ciągu ostatnich 6 miesięcy?

Ile razy w ciągu ostatnich 6 miesięcy konieczne było udanie się do szpitala z powodu zaostrzenia astmy?

Czy odczuwasz jakiegokolwiek działania niepożądane leczenia?

Tak albo Nie

Jeśli **tak**, to jakie?

Czy są jakiegokolwiek codzienne czynności, których nie jesteś w stanie wykonać?

Jeśli **tak**, to jakie?

W miarę postępów leczenia sprawdzaj tę stronę, aby sprawdzić, czy coś się zmieniło.

Informacje na temat Twojej astmy w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Fasenra

Numer wstrzyknięcia	2 Data:.....	3 Data:.....	4 Data:.....
Od ostatniego wstrzyknięcia leku Fasenra:			
Jak oceniasz występujące objawy astmy? Od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Dobrze”, a 5 oznacza „Źle”			
Jak często objawy wpływają na Twój sen? Od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Rzadko”, a 5 oznacza „Każdej nocy”			
Ile razy w tygodniu musisz korzystać z inhalatora z lekiem łagodzącym?			
Ile napadów astmy wystąpiło?			
Ile cykli leczenia doustnymi sterydami w tabletkach zastosowano?			
Ile razy konieczne było udanie się do szpitala z powodu zaostrzenia astmy?			
Czy odczuwasz jakiegokolwiek działania niepożądane leczenia? Tak albo Nie Jeśli tak , to jakie?			
Czy są jakiegokolwiek codzienne czynności, których nie jesteś/jesteś w stanie teraz wykonywać? Tak albo Nie Jeśli tak , to jakie?			

Informacje na temat Twojej astmy w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Fasenra

Numer wstrzyknięcia	5	6	7	8
	Data:.....	Data:.....	Data:.....	Data:.....
Od ostatniego wstrzyknięcia leku Fasenra:				
Jak oceniasz występujące objawy astmy? Od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Dobrze”, a 5 oznacza „Źle”				
Jak często objawy wpływają na Twój sen? Od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Rzadko”, a 5 oznacza „Każdej nocy”				
Ile razy w tygodniu musisz korzystać z inhalatora z lekiem łagodzącym?				
Ile napadów astmy wystąpiło?				
Ile cykli leczenia doustnymi sterydami w tabletkach zastosowano?				
Ile razy konieczne było udanie się do szpitala z powodu zaostrzenia astmy?				
Czy odczuwasz jakiegokolwiek działania niepożądane leczenia? Tak albo Nie Jeśli tak , to jakie?				
Czy są jakiegokolwiek codzienne czynności, których nie jesteś/które jesteś w stanie teraz wykonywać? Tak albo Nie Jeśli tak , to jakie?				

Moje cele

Czy jest coś, co chcesz zrobić, ale powstrzymuje Cię astma?

Ta część jest przeznaczona do zapisywania krótkoterminowych celów, jakie chcesz osiągnąć po rozpoczęciu leczenia z zastosowaniem leku Fasenra. Pomyśl o codziennej czynności, która sprawia Ci trudność z powodu astmy, na przykład samodzielne chodzenie na zakupy.

Moje cele krótkoterminowe

(Przykłady: chodzenie na zakupy, wykonywanie prac domowych, gotowanie na stojąco)

.....	
.....	
.....	

**należy wypełnić
tę stronę z pomocą
lekarza/pielęgniarki**

Mając na uwadze swoje osiągnięcia z kilku ostatnich kilku miesięcy, co chcesz osiągnąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy?

W tej części możesz zapisać wszystkie ważne czynności, które wcześniej sprawiały trudność albo których unikałeś(-aś) z powodu astmy.

Moje cele długoterminowe

**(Przykłady: spędzenie weekendu poza domem,
wybranie się na krótką przejażdżkę rowerem po parku,
zabawa z dziećmi/wnukami)**

.....	
.....	
.....	

W przypadku każdej wizyty u lekarza/pielęgniarki sprawdź, co udało Ci się osiągnąć, i zaznacz to, aby pokazać swoje postępy.

Informacje o możliwych działaniach niepożądanych

Podobnie jak w przypadku każdego leku, w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Fasenna mogą wystąpić pewne działania niepożądane, jednak nie u wszystkich one wystąpią.

Częste działania niepożądane, które mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów z astmą, to:

- Ból głowy
- Zapalenie gardła (ból gardła)
- Gorączka (wysoka temperatura)
- Reakcja w miejscu wstrzyknięcia (np. ból, zaczerwienienie, świąd, obrzęk w pobliżu miejsca podania wstrzyknięcia)

U niektórych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Reakcje te są częste (mogą one wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

Objawy są zazwyczaj następujące:

- Pokrzywka
- Wysypka

W niektórych przypadkach może wystąpić ciężka reakcja alergiczna określana jako anafilaksja.

Częstości występowania nie można jednak określić na podstawie dostępnych danych.

Objawy są zazwyczaj następujące:

- Obrzęk twarzy, języka albo ust
- Problemy z oddychaniem
- Omdlenia, zawroty głowy, uczucie oszołomienia (spowodowane spadkiem ciśnienia krwi)

W przypadku podejrzenia wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Reakcje takie mogą wystąpić w ciągu kilku godzin albo dni po wstrzyknięciu.

Więcej informacji na temat możliwych działań niepożądanych można znaleźć w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania leku Fasenna.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą

Gdzie można uzyskać wsparcie i porady?

Należy wypełnić ten formularz z pomocą lekarza albo pielęgniarki:

Imię i nazwisko lekarza/pielęgniarki:

Dane kontaktowe:

Uwagi:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zgłaszanie działań niepożądanych

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą albo pielęgniarką. Obejmuje to wszelkie możliwe działania niepożądane niewymienione w ulotce dołączonej do opakowania.

Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio za pośrednictwem programu Yellow Card Scheme: **www.mhra.gov.uk/yellowcard**

Zgłaszając działania niepożądane, możesz dostarczyć więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku

Fasenra[®]360[°]

Ciągłe wsparcie w trakcie leczenia

**Infolinia dla
pacjentów:
08004 700329**

Pon.-pt. 8:00-18:00 | Sob. 9:00-17:00

Poza godzinami pracy prosimy o kontakt ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą, a w nagłych przypadkach należy zadzwonić pod numer 999.

Wyprodukowane i
sfinansowane przez:

AstraZeneca

