

Fasenra® (benralizumab)

Informații utile despre tratamentul astmului dumneavoastră sever

Bine ați venit la broșura cu informații pentru pacient!

În această broșură veți găsi:

- **Informații pentru pacient despre Fasenra** (paginile 2-6)
- **Instrucțiuni pentru autoadministrarea Fasenra** (paginile 7-11)
- **Planul dumneavoastră de tratament cu Fasenra** (paginile 12-18)

Această broșură este destinată pacienților din Regatul Unit cărora li s-a prescris Fasenra pentru astm eozinofilic sever. Acesta nu înlocuiește Prospectul cu informații pentru pacient, pe care trebuie să îl citiți împreună cu această broșură și care se găsește în fiecare cutie de Fasenra.

Fasenra[®] 360[®]

**Suport continuu pe parcursul
tratamentului dumneavoastră**

**Linia telefonică
pentru pacienți:
08004 700329**

Luni-Vineri 8:00-18:00 | Sâmbătă 9:00-17:00

În afara orelor de program, vă rugăm să contactați medicul, asistenta medicală sau farmacistul dumneavoastră sau, în caz de urgență, apelați 999.

Această broșură a fost elaborată și finanțată de AstraZeneca, producătorul Fasenra.


Ce este astmul eozinofilic?

Eozinofilele sunt un tip de celule albe din sânge. Aceste celule lucrează pentru a vă proteja organismul împotriva anumitor infecții.

De obicei, eozinofilele trăiesc pentru o perioadă scurtă de timp în organism și, odată ce și-au făcut treaba, organismul le elimină.

Însă la persoanele cu astm eozinofilic, există prea multe eozinofile în sânge, care se deplasează în plămâni, provocând inflamație, care la rândul ei conduce la probleme respiratorii.

Medicul dumneavoastră a concluzionat că simptomele astmului dumneavoastră sunt legate de niveluri ridicate de eozinofile.




celulă eozinofilă
din plămâni

De ce v-a prescris medicul Fasenra?

Fasenra este un tratament injectabil pentru astmul eozinofilic sever care vizează direct eozinofilele, ajutând organismul să le elimine din sângele și plămânii dvs.

Acest lucru ar putea reduce numărul de atacuri de astm pe care le aveți, vă poate ajuta să respirați mai bine și să vă diminueți simptomele de astm.

Este important să continuați să luați orice alt tratament pentru astm (inhalatoare/ comprimate) prescris de medicul dumneavoastră.




Dacă luați „corticosteroizi orali”, utilizarea Fasenra vă poate permite, de asemenea, să reduceți doza zilnică necesară pentru a vă controla astmul sau să întrerupeți complet administrarea acestora. Trebuie să urmați sfatul medicului dumneavoastră în această privință.

Cum vi se vor administra injecțiile cu Fasenra?

Un medic, o asistentă medicală sau un alt profesionist din domeniul sănătății vă va administra injecțiile sub piele, fie în partea superioară a brațului, fie în abdomen, fie în coapsă.

Dacă medicul sau asistenta medicală nu vă recomandă altceva, programul de tratament va fi așa cum este prezentat mai jos:

Primul dumneavoastră an de tratament cu Fasenra



Dacă nu vă puteți prezenta la programarea pentru Fasenra sau ați uitat o doză de Fasenra: contactați-vă medicul sau asistenta medicală cât mai curând posibil pentru reprogramare.

Întreruperea tratamentului cu Fasenra: nu întrerupeți tratamentul cu Fasenra decât dacă medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru. Întreruperea sau oprirea tratamentului cu Fasenra poate determina reapariția simptomelor și crizelor de astm.

Există efecte secundare ale tratamentului cu Fasenra?

Ca în cazul tuturor medicamentelor, este posibil să aveți unele reacții adverse în timpul tratamentului cu Fasenra, dar nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse frecvente, care pot afecta până la 1 din 10 pacienți cu astm, includ:

- Durere de cap
- Faringită (durere în gât)
- Febră (temperatură ridicată)
- Reacție la locul injectării (de exemplu, durere, roșeață, mâncărime, umflare în apropierea locului de administrare a injectției)

Unele persoane pot avea reacții alergice.

Aceste reacții sunt frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

Simptomele includ de obicei:

- Urticarie
- Erupție cutanată

În unele cazuri, pacienții pot

să manifeste o reacție alergică severă cunoscută sub numele de anafilaxie.

Totuși, frecvența nu poate fi determinată

pe baza datelor disponibile. Simptomele includ de obicei:

- Umflarea feței, limbii sau gurilor
- Probleme respiratorii
- Leșin, amețeli, senzație de amețelă (din cauza scăderii tensiunii arteriale)

Solicitați imediat asistență medicală dacă suspectați că aveți o reacție alergică.

Astfel de reacții pot apărea în câteva ore sau zile după injectare.

Vă rugăm să consultați Prospectul cu informații pentru pacient din cutia de Fasenra pentru informații suplimentare despre posibilele reacții adverse.

**Dacă manifestați
orice reacții adverse,
vă rugăm să
discutați cu medicul
dumneavoastră,
asistenta medicală
sau farmacistul**

Informarea medicului dumneavoastră despre evoluția tratamentului dumneavoastră


Medicul sau asistenta dumneavoastră va dori să știe dacă simptomele de astm se ameliorează sau dacă acestea continuă să vă afecteze viața de zi cu zi.

Înainte de programare, petreceți câteva minute gândindu-vă la punctele de mai jos, astfel încât să le puteți oferi o imagine corectă de ansamblu asupra situației dumneavoastră.



Respirație

Tușiți sau aveți respirație șuierătoare?



Somn

Astmul dumneavoastră vă împiedică să dormiți bine noaptea?



Atacuri de astm

Câte ați avut (dacă ați avut vreuna)?
Cât de grave au fost?



Activități zilnice

Sunteți acum mai capabil(ă) să faceți anumite activități (de exemplu, cumpărături, plimbări) decât erați înainte de a începe tratamentul?
Întâmpinați dificultăți cu anumite activități?



Medicamente

Luați inhalatorul preventiv conform instrucțiunilor?
Cât de des folosiți inhalatorul pentru ameliorarea simptomelor?
Câte tablete de corticosteroizi luați?

Unde se pot găsi mai multe informații

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau farmacistul. De asemenea, ar trebui să citiți Prospectul cu informații pentru pacient, deoarece acesta conține informații utile. Puteți să găsiți Prospectul cu informații pentru pacient în fiecare cutie de Fasenna.

Autoadministrarea de FASENRA® (benralizumab)

Stilou preumplut

Înainte de a utiliza stiloul injector Fasenra, furnizorul dumneavoastră de servicii medicale trebuie să vă arate dumneavoastră sau îngrijitorului dumneavoastră cum să îl utilizați corect.

Citiți aceste „Instrucțiuni de utilizare” înainte de a începe să utilizați stiloul injector Fasenra și de fiecare dată când vi se furnizează altul. Este posibil să apară informații noi. Aceste informații nu înlocuiesc discuția cu furnizorul dumneavoastră de servicii medicale despre afecțiunea dumneavoastră medicală sau tratamentul dumneavoastră.

Dacă dumneavoastră sau persoana care vă îngrijește aveți întrebări, discutați cu furnizorul dumneavoastră de servicii medicale.

Informații importante

A se păstra Fasenra la frigider, în cutie, la o temperatură între 2 °C și 8 °C, până când sunteți gata să îl utilizați. Fasenra poate fi păstrat la temperatura camerei până la 25 °C timp de maximum 14 zile. După scoaterea din frigider, Fasenra trebuie utilizat în termen de 14 zile sau aruncat.

Nu utilizați stiloul dumneavoastră injector Fasenra dacă:

- a fost înghețat
- a fost scăpat sau deteriorat
- sigiliul de siguranță de pe cutie a fost rupt
- data de expirare (EXP) a trecut

Nu:

- agitați stiloul injector Fasenra
- împărțiți cu alte persoane și nu reutilizați stiloul injector Fasenra


Dacă se întâmplă oricare dintre cele de mai sus, aruncați stiloul injector Fasenra într-un recipient pentru obiecte ascuțite rezistent la perforare și utilizați un stilou injector Fasenra nou.

Fiecare stilou injector Fasenra conține 1 doză de Fasenra, destinată unei singure utilizări.

A nu se lăsa Fasenra și alte medicamente la vederea și îndemâna copiilor.


Instrucțiuni de utilizare a stiloului dumneavoastră injector Fasenra

Nu îndepărtați capacul până nu ați ajuns la Pasul 6 al acestor instrucțiuni și nu sunteți gata să injectați Fasenra.



Pasul 1 - Adunați materialele

- 1 stilou injector Fasenra din frigider
 - 1 șervețel cu alcool
 - 1 bucată de vată sau tifon
 - 1 recipient pentru obiecte ascuțite rezistent la perforare.
- (A se vedea Pasul 10 – Eliminați în siguranță stiloul injector Fasenra utilizat)



Pasul 2 - Pregătiți-vă pentru utilizarea stiloului injector Fasenra

Verificați data de expirare (EXP). Nu utilizați dacă data de expirare a trecut.

Înainte de administrare, lăsați stiloul injector preumplut să atingă temperatura camerei între 20 °C și 25 °C, lăsând cutia în afara frigiderului timp de aproximativ 30 de minute.

Nu încălziți stiloul injector Fasenra în niciun alt mod. De exemplu, nu îl încălziți la microunde sau în apă fierbinte și nu îl puneți lângă alte surse de căldură.

Utilizați Fasenra în termen de 14 zile de la scoaterea din frigider.

Nu scoateți capacul până nu ați ajuns la Pasul 6.




Pasul 3 - Verificați lichidul

Priviți lichidul din stiloul injector Fasenra prin fereastra de vizualizare. Lichidul trebuie să fie limpede și incolor până la galben. Poate conține particule mici albe.

Nu injectați Fasenra dacă lichidul este tulbure, decolorat sau conține particule mari.

Este posibil să observați o mică bulă de aer în lichid. Acest lucru este normal. Nu trebuie să faceți nimic în privința aceasta.



Pasul 4 - Alegeți locul de injectare


Locul recomandat pentru injectare este partea anterioară a coapsei. Puteți folosi și partea inferioară a abdomenului.

Nu injectați:

- în zona de 5 cm din jurul buricului
- în zone în care pielea este sensibilă, învinețită, solzoasă sau dură
- în cicatrici sau piele deteriorată
- prin îmbrăcăminte

Un îngrijitor vă poate face injecția în partea superioară a brațului, coapsă sau abdomen. **Nu** încercați să vă injectați singur(ă) în braț.

Pentru fiecare injecție, alegeți un loc diferit care să fie la cel puțin 3 cm distanță de locul unde ați făcut ultima injecție.




Pasul 5 - Curățați locul de injectare

Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun.

Curățați locul de injectare cu un șervețel cu alcool, prin mișcări circulare. Lăsați-l să se usuce la aer.

Nu atingeți zona curățată înainte de injectare.

Nu ventilați și nu suflați pe zona curățată.



Pasul 6 - Scoateți capacul

Țineți stiloul injector Fasenra cu o mână. Trageți cu grijă capacul drept afară cu cealaltă mână.


Puneți capacul deoparte pentru a-l arunca mai târziu.

Protecția verde a acului este acum expusă. Este acolo pentru a vă împiedica să atingeți acul.

Nu încercați să atingeți acul sau să apăsați pe protecția acului cu degetul.

Nu încercați să puneți la loc capacul pe stiloul injector Fasenra. Ați putea face ca injecția să se facă prea devreme sau acul să se deterioreze.

Parcurgeți următorii pași imediat după scoaterea capacului.




Pasul 7 - Injectarea cu Fasenra

Urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră privind modul de injectare. Puteți fie să ciupiți ușor locul injectării, fie să administrați injectia fără să ciupiți pielea.

Injectați Fasenra urmând pașii din figurile **a**, **b**, **c** și **d**.


Țineți pe loc stiloul injector Fasenra pe toată durata injectiei.

Nu schimbați poziția stiloului injector Fasenra după începerea injectiei.




Poziționați stiloul injector Fasenra la locul de injectare.

Așezați protecția acului stiloului injector Fasenra în contact complet cu pielea (în unghi de 90 de grade). Asigurați-vă că puteți vedea fereastra de vizualizare.




Apăsați în jos ferm.

Veți auzi un clic. Un „clic” vă indică faptul că injectia a început. Pistonul verde se va mișca în jos în fereastra de vizualizare în timpul injectiei.



Țineți apăsat în jos ferm timp de 15 secunde.

Veți auzi un al doilea „clic”. Al doilea clic vă spune că injectia s-a terminat. Pistonul verde va umple fereastra de vizualizare.



Ridicați stiloul injector Fasenra drept în sus.

Protecția acului va aluneca în jos și se va bloca în poziție peste ac.

Pasul 8 - Verificați fereastra de vizualizare


Verificați fereastra de vizualizare pentru a vă asigura că tot lichidul a fost injectat.

Dacă pistonul verde nu umple fereastra de vizualizare, este posibil să nu fi primit doza completă. Dacă se întâmplă acest lucru sau dacă aveți alte nelămuriri, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii medicale.

Înainte de
injectare



După
injectare




Pasul 9 - Verificați locul de injectare

Este posibil să existe o cantitate mică de sânge sau lichid la locul de injectare. Acest lucru este normal.

Mențineți ușor presiunea pe piele cu o bucată de vată sau un tifon până când sângerarea se oprește.

Nu frecați locul de injectare.

Dacă este necesar, acoperiți locul de injectare cu un bandaj mic.



Pasul 10 - Eliminați în siguranță stiloul injector Fasenra utilizat

- Fiecare stilou injector Fasenra conține o singură doză de Fasenra și **nu poate fi reutilizat**.
- Puneți stiloul injector Fasenra utilizat într-un **recipient pentru obiecte ascuțite**, rezistent la perforare, imediat după utilizare.

Nu aruncați stiloul injector Fasenra la gunoiul menajer.

Aruncați capacul și alte consumabile folosite la gunoiul menajer.



Instrucțiuni de eliminare

Eliminați recipientul plin conform instrucțiunilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Nu reciclați recipientul pentru obiecte ascuțite folosit.

Planul dumneavoastră de tratament cu Fasenra® (benralizumab) pentru astmul sever

Folosiți această secțiune pentru a urmări programul de tratament, modificările simptomelor și progresul general în timpul tratamentului cu Fasenra.

Nume:

Numele medicului/asistentei medicale:

Urmărirea modului în care Fasenra funcționează pentru dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să vă ameliorați simptomele de astm, medicul dumneavoastră v-a prescris Fasenra.

Vă rugăm să completați această secțiune cu ajutorul medicului/asistentei medicale.

Acest tratament se administrează sub formă de injecție, deci ar putea fi diferit de alte medicamente pentru astm pe care le-ați utilizat în trecut. Această secțiune este concepută pentru a vă ajuta pe parcursul tratamentului.

Cu excepția cazului în care vi s-a spus altfel, tratamentul dumneavoastră va fi administrat la fiecare patru săptămâni pentru primele trei injecții și apoi o dată la fiecare opt săptămâni. Este important să continuați să luați orice alt tratament pentru astm (inhalatoare/ comprimate) prescris de medicul dumneavoastră.

Înainte de fiecare programare, vă rugăm să completați „Fișa de urmărire a simptomelor” de la paginile 15 și 16. Aduceți această broșură la fiecare consultație pentru a-l ajuta pe medicul sau asistenta medicală să înțeleagă cum evoluează tratamentul.

Pe măsură ce începeți tratamentul cu Fasenra, ar putea fi util să vă notați obiectivele pe termen scurt și lung la pagina 17, apoi să vedeți câte puteți realiza.

Planul dumneavoastră de tratament pentru astm

Fasenra

Primele 3 injecții la fiecare 4 săptămâni, apoi la fiecare 8 săptămâni

Medicamentele dumneavoastră zilnice

Enumerați fiecare dintre medicamentele dumneavoastră zilnice pentru astm pe rândurile de mai jos:

Medicament	Doza zilnică, de exemplu, numărul de inhalări sau comprimate

Inhalatorul dumneavoastră albastru (dacă aveți unul)

Este posibil să luați mai mult sau mai puțin din inhalatorul albastru, în funcție de simptomele de astm, așa că vă rugăm să notați cea mai recentă doză:

Medicament	Doză, de exemplu, numărul de inhalări	Cât durează până când simptomele se ameliorează?

Dacă aveți un atac de astm, solicitați imediat sfatul medicului, apelați 999 și urmați planul personal de acțiune pentru astm.

Urmărirea îmbunătățirilor

Este o idee bună să notați modificările simptomelor dumneavoastră de astm pentru a-l ajuta pe medicul sau asistenta medicală să urmărească progresul tratamentului.

Completarea fișei de mai jos vă va oferi o evidență exactă a modului în care v-ați simțit înainte de a începe tratamentul cu Fasenra. Comparând aceste informații cu cele înregistrate în timpul tratamentului cu Fasenra, veți putea vedea dacă simptomele dumneavoastră se ameliorează și dacă sunteți capabil(ă) să desfășurați activități zilnice pe care anterior le considerați prea dificile.

Prezentare generală a astmului de care suferiți înainte de a începe să utilizați Fasenra

Cum ați evalua simptomele dumneavoastră de astm?

De la 1 la 5, unde 1 este „Bun”, 5 este „Rău”

Cât de des vă afectează simptomele somnul?

De la 1 la 5, unde 1 înseamnă „Rareori”, 5 înseamnă „În fiecare noapte”

De câte ori pe săptămână trebuie să folosiți inhalatorul pentru ameliorarea simptomelor?

Câte atacuri de astm ați avut în ultimele 6 luni?

Câte cure de comprimate cu steroizi orali ați avut în ultimele 6 luni?

În ultimele 6 luni, de câte ori a trebuit să mergeți la spital pentru că astmul dumneavoastră s-a agravat?

Aveți efecte secundare ca urmare a tratamentului?

Da sau nu

Dacă **da**, care sunt acestea?

Există activități zilnice pe care nu le puteți face?

Dacă **da**, care sunt acestea?

Pe măsură ce tratamentul dumneavoastră progresează, consultați din nou această pagină pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva.

Prezentare generală a astmului de care suferiți, în timpul tratamentului cu Fasenra

Numărul injecției	2 Data:	3 Data:	4 Data:
De la ultima injecție cu Fasenra:			
Cum ați evalua simptomele dumneavoastră de astm? De la 1 la 5, unde 1 este „Bun”, 5 este „Rău”			
Cât de des vă afectează simptomele somnului? De la 1 la 5, unde 1 înseamnă „Rareori”, 5 înseamnă „În fiecare noapte”			
De câte ori pe săptămână trebuie să folosiți inhalatorul pentru ameliorarea simptomelor?			
Câte atacuri de astm ați avut?			
Câte cure de comprimate cu steroizi orali ați avut?			
De câte ori a trebuit să mergeți la spital pentru că astmul dumneavoastră s-a agravat?			
Aveți efecte secundare ca urmare a tratamentului? Da sau nu Dacă da , care sunt acestea?			
Există activități zilnice pe care nu le puteți face/le puteți face acum? Da sau nu Dacă da , care sunt acestea?			

Prezentare generală a astmului de care suferiți, în timpul tratamentului cu Fasenra

Numărul injecției	5	6	7	8
	Data:	Data:	Data:	Data:
De la ultima injecție cu Fasenra:				
Cum ați evalua simptomele dumneavoastră de astm? De la 1 la 5, unde 1 este „Bun”, 5 este „Rău”				
Cât de des vă afectează simptomele somnului? De la 1 la 5, unde 1 înseamnă „Rareori”, 5 înseamnă „În fiecare noapte”				
De câte ori pe săptămână trebuie să folosiți inhalatorul pentru ameliorarea simptomelor?				
Câte atacuri de astm ați avut?				
Câte cure de comprimate cu steroizi orali ați avut?				
De câte ori a trebuit să mergeți la spital pentru că astmul dumneavoastră s-a agravat?				
Aveți efecte secundare ca urmare a tratamentului? Da sau nu Dacă da , care sunt acestea?				
Există activități zilnice pe care nu le puteți face/le puteți face acum? Da sau nu Dacă da , care sunt acestea?				

Obiectivele mele

Ce ați vrea să faceți și astmul vă împiedică?

Scopul acestei secțiuni este să vă înregistrați obiectivele pe termen scurt după începerea tratamentului cu Fasenra. Gândiți-vă la o activitate zilnică care vi s-a părut dificilă din cauza astmului, de exemplu, mersul pe jos, singur(ă), până la magazine.

Obiectivele mele pe termen scurt

(Exemple: să merg pe jos la magazine, să fac unele treburi prin casă, să gătesc în picioare)

.....	
.....	
.....	

Vă rugăm să completați această pagină cu ajutorul medicului/asistentei medicale.

Gândindu-vă la ce ați realizat în ultimele luni, ce v-ați dori să realizați în următoarele câteva luni?

În această secțiune, puteți înregistra orice activități semnificative pe care anterior le-ați considerat dificil de făcut sau pe care le-ați evitat din cauza astmului dumneavoastră.

Obiectivele mele pe termen lung

(Exemple: să mă bucur de o excursie de weekend, să merg într-o scurtă plimbare cu bicicleta prin parc, să mă joc cu copiii/nepoții mei)

.....	
.....	
.....	

De fiecare dată când aveți o programare la medic/asistentă, verificați ce ați realizat și bifați pentru a-i arăta progresul pe care îl faceți.

Informații despre posibilele efecte secundare

Ca în cazul tuturor medicamentelor, este posibil să aveți unele reacții adverse în timpul tratamentului cu Fasenra, dar nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse frecvente, care pot afecta până la 1 din 10 pacienți cu astm, includ:

- Durere de cap
- Faringită (durere în gât)
- Febră (temperatură ridicată)
- Reacție la locul de injectare (de exemplu, durere, roșeață, mâncărime, umflare în apropierea locului de injectare)

Unele persoane pot avea reacții alergice.

Aceste reacții sunt frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

Simptomele includ de obicei:

- Urticarie
- Erupecie cutanată

În unele cazuri, pacienții pot prezenta o reacție alergică severă, cunoscută sub numele de anafilaxie. Totuși, frecvența nu poate fi determinată pe baza datelor disponibile.

Simptomele includ de obicei:

- Umflarea feței, limbii sau gurii
- Probleme respiratorii
- Leșin, amețeli, senzație de amețelă (din cauza scăderii tensiunii arteriale)

Solicitați imediat asistență medicală dacă suspectați că aveți o reacție alergică.

Astfel de reacții pot apărea în câteva ore sau zile după injectare.

Vă rugăm să consultați Prospectul cu informații pentru pacient din cutia de Fasenra pentru informații suplimentare despre posibilele reacții adverse.

Dacă manifestați orice reacții adverse, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau farmacistul

Unde să vă adresați pentru sprijin și sfaturi

Completați acest formular cu ajutorul medicului sau asistentei medicale:

Numele medicului/asistentei medicale:

Date de contact:

Observații:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Aceasta include orice posibile reacții adverse care nu sunt enumerate în prospect.

Puteți raporta reacțiile adverse și direct prin intermediul Yellow Card Scheme la www.mhra.gov.uk/yellowcard

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament

Fasenra[®]360[®]

Sprijin continuu pe parcursul tratamentului dumneavoastră

**Linia telefonică
pentru pacienți:
08004 700329**

Luni-Vineri 8:00-18:00 | Sâmbătă 9:00-17:00

În afara orelor de program, vă rugăm să contactați medicul, asistenta medicală sau farmacistul dumneavoastră sau, în caz de urgență, apelați 999.

Produs și finanțat de:

AstraZeneca

